УДК 616.284-003.2-053.2-089 DOI: 10.18692/1810-4800-2018-5-115-121

ЛЕЧЕНИЕ ЭКССУДАТИВНОГО СРЕДНЕГО ОТИТА У ДЕТЕЙ

Красножен В. Н.[1], Андреева И. Г.[1,2], Токарев П. В.[2]

[1] ГБОУ ВО «Казанская государственная медицинская академия» – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, 420012, г. Казань, Россия
(Директор – засл. врач РФ и РТ, член-корр. РАН, проф. Р. Ш. Хасанов)

[2] ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница» Минздрава Республики Татарстан, 420138, г. Казань, Россия
(Главный врач – канд. мед. наук Р. Ф. Шавалиев)

THE TREATMENT OF EXUDATIVE OTITIS MEDIA IN CHILDREN

Krasnozhen V. N.[1], Andreeva I. G.[1,2], Tokarev P. V.[2]

[1] State Budgetary Educational Institution of Further Vocational Education Kazan State Medical Academy – Branch of FSBEI FVE Russian Medical Academy of Continuing Professional Education of the Ministry of Healthcare of Russia, Kazan, Russia

[2] State Autonomous Health Institution Children's Republican Clinical Hospital of the Ministry of Healthcare of the Republic of Tatarstan, Kazan, Russia

Одной из самых частых патологий среднего уха является экссудативный средний отит (ЭСО), который характеризуется накоплением экссудата в полостях среднего уха, приводит к кондуктивной или смешанной тугоухости. Малосимптомное течение заболевания, особенно в детском возрасте, влияет на формирование речи детей, ухудшает способности к обучению, опосредованно влияет на интеллектуальное развитие и социальную адаптацию и в конечном итоге на качество жизни человека любого возраста. В статье освещены три теории возникновения ЭСО и часто используемая в России классификация ЭСО. Рассмотрены консервативные методы лечения и применение симультанных операций для устранения причин образования экссудата в среднем ухе, а также их последствий.

Ключевые слова: экссудативный средний отит, тимпаностомия, миринготомия, детский возраст.
Библиография: 39 источников.

One of the most frequent pathologies of the middle ear is the exudative otitis media (EOM), characterized by the accumulation of exudate in the middle ear cavities resulting in conductive or mixed hearing loss. Oligosymptomatic progress of the disease, especially in children, affects the development of speech of children, worsens the ability to learn, indirectly affects the intellectual development and social adaptation, and, ultimately, the life quality of a person of any age. The article covers three theories of EOM generation and EOM classification frequently used in Russia. The authors have considered the conservative treatment methods and the application of simultaneous operations to eliminate the causes of exudation in the middle ear, as well as their consequences.

Key words: exudative otitis media, tympanostomy, myringotomy, childhood.
Bibliography: 39 sources.

Одной из самых частых патологий среднего уха является экссудативный средний отит (ЭСО), который характеризуется накоплением экссудата в полостях среднего уха с постепенными дегенеративными проявлениями и приводит к кондуктивной или смешанной тугоухости. Малосимптомное течение заболевания, особенно в детском возрасте, влияет на формирование речи детей, ухудшает способности к обучению, опосредованно влияет на интеллектуальное развитие и социальную адаптацию и в конечном итоге на качество жизни человека любого возраста [1, 2].

В России свыше 13 млн человек страдает различными нарушениями слуха, около 1 млн составляют дети и, по данным ВОЗ, к 2020 г. их число увеличится на 30%. Более $^1/_3$ всех случаев тугоухости и глухоты связаны с нарушением функции слуховой трубы (СТ) [3].

По данным разных авторов, до 80–90% детей до школы переносят хотя бы один эпизод ЭСО [4, 5]. В различных источниках упоминается о трех классических теориях этиологии и патогенеза ЭСО [6]. Так, существует концепция hydrops ex vacuo, предложенная Politzer, согласно которой из-за формирования отрицательного давления