



РАНЕНИЯ ШЕИ: ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Мустафаев Д. М., Егоров В. И.

ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского», 129110, Москва, Россия
(Директор – проф. Ф. Н. Палеев)

NECK INJURIES: LITERATURE REVIEW

Mustafaev D. M., Egorov V. I.

State-Financed Health Institution of Moscow Region Moscow Regional Scientific and Research Clinical Institute named after M. F. Vladimirskiy, Moscow, Russia

Одной из сложных и актуальных проблем современной неотложной хирургии является лечение пострадавших с ранениями шеи. Массивная кровопотеря, асфиксия, воздушная эмболия, обусловленные повреждением магистральных сосудов шеи, сочетанное повреждение полых органов определяют прогрессирующую дестабилизацию жизненно важных функций организма, тяжесть состояния и высокую летальность данной категории пациентов. В настоящей статье представлен обзор литературы, посвященной вопросам диагностики и лечения ранений шеи. В обзоре освещены такие проблемы, как история развития взглядов на ранения шеи, эпидемиология, классификация, вопросы диагностики и тактика лечения.

Ключевые слова: шея, ранения.

Библиография: 30 источников.

One of the most difficult and urgent problems of the present-day surgery is the treatment of patients with neck injuries. Massive hemorrhage, asphyxia, air embolism caused by the damage of the great neck vessels; the combined injuries of hollow organs determine the progressive destabilization of the vital functions of organism, the condition severity and high mortality of this category of patients. This article presents a review of the literature dedicated to diagnostics and treatment of neck injuries. The review highlights such issues as the history of the development of views on the neck injuries, epidemiology, classification, diagnostics and treatment.

Key words: neck, injuries.

Bibliography: 30 sources.

Одной из сложных и актуальных проблем современной неотложной хирургии является лечение пострадавших с ранениями шеи. Массивная кровопотеря, асфиксия, воздушная эмболия, обусловленные повреждением магистральных сосудов шеи, сочетанное повреждение полых органов определяют прогрессирующую дестабилизацию жизненно важных функций организма, тяжесть состояния и высокую летальность данной категории раненых.

Древнейшим свидетельством о ранениях шеи является египетский папирус, относящийся к 3000 г. до н. э., найденный и переведенный Эдвардом Смитом. В папирусе, автором которого является Имхотеп, имеются данные о ранении шеи с повреждением пищевода [1, 2]. Самая распространенная методика временной остановки кровотечения путем дозированного пальцевого прижатия сосуда описывалась Клавдием Галеном (130–200 гг. н. э.) в труде «De anatomicis administrationibus». А. Паре в 1552 г. перевязал общую сонную артерию и внутреннюю яремную вену при ранении шеи шпагой [3]. В 1803 г.

Флеминг опубликовал результат лечения раненого в шею путем перевязки общей сонной артерии [4].

В целом до XIX века опыт лечения ранений шеи носил собирательный характер, число благоприятных исходов исчислялось единицами. Первопроходцем в систематическом изучении ранений шеи был наш соотечественник Н. И. Пирогов. Так, в 1855 г. Н. И. Пирогов впервые дал систематизированное изложение клиники и лечения повреждения сосудов. Привел топографо-анатомические обоснования доступов к магистральным сосудам человеческого тела. Во время Крымской войны им были произведены четыре перевязки сонных артерий, две из них имели благоприятный исход [5].

Беспрецедентный опыт в лечении ранений шеи человечество приобрело в XX в., во время двух кровопролитных мировых войн.

Число больных с ранениями шеи не уменьшается в связи с неблагоприятной криминальной обстановкой и наличием локальных военных конфликтов. По данным литературы, частота ра-