УДК 616.21-002.5 doi: 10.18692/1810-4800-2017-4-32-38

ВОПРОСЫ ТУБЕРКУЛЕЗА В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

Гюсан А. О.[1,2], Ураскулова Б. Б.[1,2,3]

ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия» РГБ ЛПУ

[1] (Зав. каф. оториноларингологии-хирургии головы и шеи – засл. врач РФ, проф. А. О. Гюсан)

[2] РГБ ЛПУ «Республиканская клиническая больница», 369000, г. Черкесск, Россия (Главный врач – засл. врач КЧР, канд. мед. наук И. Д. Гербекова)

[3] РГБ ЛПУ «Карачаево-Черкесский республиканский противотуберкулезный диспансер», 369001, г. Черкесск, Россия (Главный врач – С. Х. Баймаруков)

THE PROBLEMS OF TUBERCULOSIS IN OTORHINOLARYNGOLOGY

Gyusan A. O., Uraskulova B. B.

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Vocational Education North Caucasian State Humanitarian Technological Academy,

[1] Republic State Budgetary Prevention and Treatment Facility

[2] Republic State Budgetary Prevention and Treatment Facility Republic Clinical Hospital, Cherkessk, Russia

[3] Republic State Budgetary Prevention and Treatment Facility Karachaevo-Cherkessian Republic Antituberculosis Dispensary,Cherkessk, Russia

В работе проведен анализ региональных особенностей распространенности туберкулеза верхних дыхательных путей в Карачаево-Черкесии, изучена структура данной патологии, клинико-морфологические изменения в гортани при разном патогенезе заболевания. Рассмотрены вопросы повышения эффективности диагностики и лечения заболевания.

Ключевые слова: туберкулез верхних дыхательных путей, эпидемиология, структура.
Библиография: 24 источника.

The paper analyzes the regional features of the prevalence of the upper respiratory tract tuberculosis in Karachaevo-Cherkessia, providing the study of the structure of this pathology, clinical and morphological changes in the larynx at different pathogenesis of the disease. The authors have considered the problems of increasing the efficiency of diagnosis and treatment of the disease.

Key words: upper respiratory tract tuberculosis; epidemiology; structure.
Bibliography: 24 sources.

По данным ВОЗ, одна треть населения мира инфицирована микобактериями туберкулеза. Он объявлен глобальной проблемой, наносящей человечеству колоссальный экономический и биологический ущерб [1–4]. Это одна из 10 ведущих причин смерти в мире [5]. В 2015 г. в мире туберкулезом заболели 10,4 миллиона человек и 1,8 миллиона умерли от этой болезни. В настоящее время Россия относится к 22 странам с самой высокой заболеваемостью туберкулезом. В связи с этим интерес к туберкулезной инфекции и разработке стратегии борьбы с ней возрастает, однако вопросы внелегочного туберкулеза остаются вне поля зрения [6, 7]. Согласно данным иностранной литературы на сегодняшний день внелегочная локализация туберкулеза выявляется от 25 до 50% случаев легочного туберкулеза, в Российской Федерации этот процент снижен до 4,6%, несмотря на широкую распространенность легочного туберкулеза [8]. Туберкулез способен поражать любой орган верхних дыхательных путей [9]. Согласно данным литературы, специфический процесс чаще поражает гортань (88,6%), после глотку (4,6 %), небные миндалины (2,7%), нос и ухо (2%) [10–12].

Цель исследования. Анализ региональных особенностей распространенности туберкулеза верхних дыхательных путей в Карачаево-Черкесии, изучение структуры данной патологии, клинико-морфологические изменения в гортани при разном патогенезе заболевания. Изучение вопросов повышения эффективности диагностики и лечения заболевания.

Объектами исследования были 966 больных, находившихся на лечении в Республиканском противотуберкулезном диспансере на протяжении 5 лет, и 361 больной, проходивших санаторно-курортное лечение на территории противотуберкулезного санатория «Теберда».