



СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПСИХИЧЕСКОГО СТАТУСА ПАЦИЕНТОВ ГОЛОСОРЕЧЕВЫХ ПРОФЕССИЙ С ДИСФОНИЯМИ И ВЗРОСЛЫХ ЗАИКАЮЩИХСЯ

Степанова Ю. Е., Калягин В. А., Абдурахманов М. А.

ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ уха горла носа и речи» Минздрава России, 190013, Санкт-Петербург, Россия
(Директор – засл. врач РФ, акад. РАН, проф. Ю. К. Янов)

A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RELATIONS OF ADULT PATIENTS VOTES VIOLATIONS AND STUTTERING

Stepanova Yu. E., Kalyagin V. A., Abdurakhmanov M. A.

Federal State Budgetary Institution "Saint Petersburg Research Institute of Ear, Throat, Nose and Speech", Ministry of Health of the Russian Federation, Saint Petersburg, Russia

В статье с позиций психосоматического подхода сравнивается психический компонент в клинической картине нарушений голоса и заикания как вариантов коммуникативного расстройства. С помощью батареи психодиагностических методик обследовано 109 взрослых больных с нарушениями голоса и 102 взрослых заикающихся пациента, результаты которых рассмотрены с позиций концепции внутренней картины болезни. Фиксация на заболевании более выражена у заикающихся, а по показателям нейротизма, интроверсии и алекситимии – у больных с дисфонией. В дисперсии психических характеристик ведущее значение имеют индивидуальные особенности больных.

Ключевые слова: взрослые, голос, речь, нарушения голоса, заикание, психосоматические отношения, внутренняя картина болезни.

Библиография: 10 источников.

In the article from the standpoint of psychosomatic approach compares the mental component of the clinical picture and stuttering voices violations as variants of communicative disorders. Using batteries psychodiagnostic techniques surveyed 109 adult patients with voice disorders and 102 adults who stutter, the results of which are considered from the perspective of the concept of the inner picture of the disease. Fixing the disease more expressed in stutterers, and neuroticism indicators, Introversion and alexithymia – in patients with dysphonia. The dispersion of mental characteristics leading value have individual characteristics of patients.

Key words: adult, voice, speech, voice disorder, stuttering, psychosomatic relationship, internal picture of the disease.

Bibliography: 10 sources.

Лица, страдающие коммуникативными нарушениями на почве расстройств речи и голоса, требуют специального изучения и особых видов помощи [1–3]. Обычно разные виды нарушений коммуникаций изучаются отдельно, а их специфика декларируется без специальных исследований. В настоящей работе предпринята попытка сравнить психическую реакцию на свой дефект личности больного в зависимости от характера коммуникативного нарушения – дисфонии или заикания. В основу работы положено представление о том, что отношение к своей болезни, требует вычленения из множества событий необычных, чтобы вызвать полезную адаптивную реакцию. Ганс Селье описал ее как биологический адаптационный синдром, представляющий последовательность трех стадий – тревоги, резистентности и истощения. Важную роль в борьбе

с болезнью имеют психические механизмы, которые рассматриваются с позиций внутренней картины болезни [1].

Цель исследования. Сравнение психического статуса взрослых больных с нарушениями голоса и заикающихся.

Организация и методика исследования. Исследование выполняли на базе Санкт-Петербургского НИИ уха, горла, носа и речи Министерства здравоохранения России и факультета коррекционной педагогики Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена при участии 120 практически здоровых студентов 3–4-го курсов, в возрасте 19 ± 2 года, а также 109 человек голосоречевых профессий с нарушениями голоса, в возрасте 45 ± 7 лет, и 102 заикающихся пациента, в возрасте 18 ± 3 лет, проходивших амбулаторное и ста-