Таблица 2

Средние результаты исследования локального МЦК среднего носового хода и сахаринового теста в основных группах (в зависимости от типа оперативного доступа к верхнечелюстной пазухе), $M \pm \sigma$

Table 2

Average results of the study of local MCC of the middle nasal passage and saccharin test in the main groups (depending on the type of surgical access to the maxillary sinus), $M \pm \sigma$

В ближайшем послеоперационном периоде (2–14 дней с момента оперативного вмешательства)						
День исследования с момента операции	До операции	2-й день	4-й день	7-й день	10-й день	12-й день
I группа (трансмаксиллярный доступ)						
Локальный МЦК среднего носового хода, Гц	11,06±3,09	8,95±3,70	8,35±2,76	11,40±2,52	10,71±2,62	10,56±3,02
Сахариновый тест, мин	14,49±3,85	14,69±3,24	14,09±3,81	14,29±2,90	13,56±3,43	13,83±3,84
II группа (эндоскопическая антростомия)						
Локальный МЦК среднего носового хода, Гц	10,25±4,43	–	–	4,25±1,94	4,58±1,88	5,21±2,67
Сахариновый тест, мин	15,54±4,57	–	–	21,26±4,56	19,59±4,10	19,14±4,73

В отдаленном послеоперационном периоде (1–6 месяцев с момента оперативного вмешательства)					
Месяц исследования с момента операции	1 мес.	2 мес.	3 мес.	4 мес.	6 мес.
I группа (трансмаксиллярный доступ)					
Локальный МЦК среднего носового хода, Гц	10,12±3,02	10,94±1,84	10,87±2,82	11,23±3,30	10,97±3,20
Сахариновый тест, мин	12,10±1,99	12,03±2,26	12,67±2,56	11,60±2,19	11,56±2,17
II группа (эндоскопическая антростомия)					
Локальный МЦК среднего носового хода, Гц	5,17±2,48	6,85±3,93	7,10±3,55	8,17±3,80	8,24±4,84
Сахариновый тест, мин	12,72±3,14	12,11±2,50	11,85±2,24	11,81±2,42	11,71±2,16



Рис. 2. Графическое представление нормализованных средних значений локального МЦК среднего носового хода и сахаринового теста в послеоперационном периоде в основных группах исследования

Fig. 2. Graphical representation of the normalized average values of the local MCC of the middle nasal passage and saccharin test in the postoperative period in the main groups of the study