

УДК 616.322-002.2+616.323-007.61]- 089.87-091.8-053.2  
<https://doi.org/10.18692/1810-4800-2024-2-53-58>

## Морфологическое обоснование этапности хирургического лечения хронических заболеваний лимфоидного аппарата глотки у детей

Т. А. Машкова<sup>1</sup>, М. С. Сорокина<sup>1</sup>, И. И. Чиркова<sup>1,2,3</sup>, А. Б. Мальцев<sup>1,4</sup>,  
И. В. Шапошникова<sup>5</sup>, О. Н. Ямщиков<sup>2,3</sup>

<sup>1</sup> Воронежский государственный медицинский университет им. Н. Н. Бурденко,  
Воронеж, 394036, Россия

<sup>2</sup> Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина,  
Тамбов, 392000, Россия

<sup>3</sup> Городская клиническая больница г. Котовска,  
Котовск, 393194, Россия

<sup>4</sup> Воронежская областная клиническая больница № 1,  
Воронеж, 394066, Россия

<sup>5</sup> Воронежское областное патологоанатомическое бюро,  
Воронеж, 394066, Россия

Несмотря на широкую распространенность сочетанного поражения органов лимфаденоидного глоточного кольца, частым выполнением аденотомии в детской практике, остается нерешенным вопрос о влиянии удаления глоточной миндалины на течение воспалительного процесса в небных миндалинах. В целях изучения влияния аденотомии на течение хронического тонзиллита был проведен сравнительный морфологический анализ 84 пар небных миндалин, полученных на этапе хирургического лечения по поводу декомпенсированного хронического тонзиллита. Препараты поделены на две группы: первую группу составили препараты больных хроническим тонзиллитом, у которых в анамнезе имела место аденотомия; вторую группу — препараты больных хроническим тонзиллитом без аденотомии в анамнезе. Согласно результатам исследования, степень выраженности воспалительных изменений небных миндалин меньше у пациентов с хроническим тонзиллитом, ранее перенесших удаление глоточной миндалины. Таким образом, полученные результаты демонстрируют положительное влияние удаления аденоида на течение хронического воспалительного процесса в небных миндалинах, а также определяют целесообразность этапного лечения пациентов с сочетанной патологией органов лимфоидного глоточного кольца.

**Ключевые слова:** хронический тонзиллит, хронический аденоидит, аденотомия, патогистологическое исследование.

**Для цитирования:** Машкова Т. А., Сорокина М. С., Чиркова И. И., Мальцев А. Б., Шапошникова И. В., Ямщиков О. Н. Морфологическое обоснование этапности хирургического лечения хронических заболеваний лимфоидного аппарата глотки у детей. *Российская оториноларингология*. 2024;23(2):53–58. <https://doi.org/10.18692/1810-4800-2024-2-53-58>