Российская оториноларингология. 2025;24(2):90–97
Russian Otorhinolaryngology. 2025;24(2):90-97

ОБЗОРЫ

УДК 616.28-008.55-02:613.11-07
https://doi.org/10.18692/1810-4800-2025-2-90-97

Роль тестов вестибулярной функции в диагностике и лечении пациентов с системным головокружением

О. С. Измайлова[1], Е. Е. Савельева[2], А. А. Рыжкин[3], А. Е. Медведев[4]

[1,2] Башкирский государственный медицинский университет, Уфа, 450008, Российская Федерация

[3,4] Уфимский университет науки и технологий, 450076, Уфа, Российская Федерация

[1] izmailva.olga@internet.ru✉,https://orcid.org/0009-0005-2401-1585
[2] surdolog@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0002-2009-8469
[3] alex.sandr00@bk.ru, https://orcid.org/0009-0002-6003-4184
[4] medvedevandreyrf@gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-8616-0042

Реферат. Головокружение — один из самых распространенных симптомов, требующих проведения клинического обследования. Вестибулярные тесты неизменно входят в число процедур, связанных с отоларингологической и неврологической практикой в некоторых странах. Однако стандартной методики для выявления причин дискомфорта и нетрудоспособности не существует, а использование вестибулярных тестов различается в разных географических регионах и медицинских специальностях. Вестибулярные тесты используются в диагностическом процессе для определения повреждения периферического отдела вестибулярной системы, однако ни один вестибулярный тест не способен оценить состояние всего лабиринта. В данном исследовании была проанализирована литература, посвященная вестибулярным тестам и видеонистагмографии (ВНГ) среди пациентов с системным головокружением. Несмотря на распространенность головокружения и разнооообразие диагностических методов, применение этих методов в широкой клинической практике затруднено, что и приводит к неправильно поставленному диагнозу, ошибочному выбору тактики лечения или оценке динамики. Понимание важности использования вестибулярных тестов, а также ограничений, ассоциированных с ними, может способствовать более эффективному лечению заболеваний, сопряженных с головокружением.
Ключевые слова: головокружение, вестибулярные нарушения, вестибулярное тестирование, калорический тест, вращательное тестирование, видеоимпульсный тест головы, видеонистагмография

Для цитирования: Измайлова О. С., Савельева Е. Е., Рыжкин А. А., Медведев А. Е. Роль тестов вестибулярной функции в диагностике и лечении пациентов с системным головокружением. *Российская оториноларингология.* 2025;24(2):90–97. https://doi.org/10.18692/1810-4800-2025-2-90-97

REWIEWS

Role of vestibular function tests in diagnosis and treatment of patients with systemic vertigo

O. S. Izmailova[1], E. E. Savel'eva[2], A. A. Ryzhkin[3], A. E. Medvedev[4]

[1,2] Bashkir State Medical University, Ufa, 450008, Russian Federation

[3,4] Ufa University of Science and Technology, Ufa, 450076, Russian Federation

[1] izmailva.olga@internet.ru✉,https://orcid.org/0009-0005-2401-1585
[2] surdolog@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0002-2009-8469
[3] alex.sandr00@bk.ru, https://orcid.org/0009-0002-6003-4184
[4] medvedevandreyrf@gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-8616-0042

Abstract. Dizziness is one of the most common symptoms requiring clinical examination. Vestibular testing is an invariable part of the procedures associated with otolaryngology and neurology practice in some countries. However, there is no standard methodology for identifying the causes of discomfort and disability, and the use

© О. С. Измайлова, Е. Е. Савельева, А. А. Рыжкин, А. Е. Медведев, 2025