Российская оториноларингология. 2025;24(2):126–130
Russian Otorhinolaryngology. 2025;24(2):126-130

ИСТОРИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

УДК 616.28-008.14/.28:616.89-092:78.071.1
https://doi.org/10.18692/1810-4800-2025-2-126-130

Оториноларингология в искусстве. Часть 1. Снижение слуха и ушной шум как один из факторов развития психогенных расстройств

К. О. Самсонова[1], Е. А. Левина[2], С. В. Левин[3], П. М. Дахадаева[4], Ю. К. Янов[5], В. В. Дворянчиков[6]

[1,2,3,4,6] *Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха горла носа и речи, Санкт-Петербург, 190013, Российская Федерация*

[5] *Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова, Санкт-Петербург, 194044, Российская Федерация*

[1] ksusha.ks4300@gmail.com✉, https://orcid.org/0009-0000-7643-4209
[2] xramoval@gmail.com, https://orcid.org/0000-0003-0285-6526
[3] megalor@gmail.com, https://orcid.org/0000-0001-9770-7739
[4] daxadaeva@list.ru, https://orcid.org/0009-0002-6701-6157;
[5] 3162256@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-0925-7596
[6] lor-obchestvo@bk.ru, https://orcid.org/0000-0001-9195-128X

Реферат. Актуальность. Проблемы со слухом разной степени имеют 4–6% людей, где доля СНТ составляет до 70%, и этот процент с каждым годом становится все выше. Данная патология часто может негативно сказываться на качестве жизни пациентов, усугубляя когнитивный дефицит (особенно в пожилом и старческом возрасте), отражаться на их психоэмоциональном статусе, вызывая и способствуя прогрессированию различных психогенных расстройств: боязливое паническое поведение, депрессии разной степени, мании, эгоцентризм, навязчивое поведение, психозы и неврозы, раздражительность, социальное одиночество и изоляция, ранняя деменция, которые усугубляются с течением времени и возрастом.
Ключевые слова: снижение слуха, глухота, шум в ушах, психогенные расстройства, искусство, Бетховен.

Для цитирования: Самсонова К. О., Левина Е. А., Левин С. В., Дахадаева П. М., Янов Ю. К., Дворянчиков В. В. Оториноларингология в искусстве. Часть 1: снижение слуха и ушной шум как один из факторов развития психогенных расстройств. *Российская оториноларингология.* 2025;24(2):126–130. https://doi.org/10.18692/1810-4800-2025-2-126-130

HISTORICAL SECTION

Otorhinolaryngology in art. Part 1: hearing loss and tinnitus as one of the factors in the development of psychogenic disorders

K. O. Samsonova[1], E. A. Levina[2], S. V. Levin[3], P. M. Dakhadaeva[4], Yu. K. Yanov[5], V. V. Dvoryanchikov[6]

[1,2,3,4,6] *Saint Petersburg Institute of Ear, Throat, Nose and Speech, Saint Petersburg, 190013, Russian Federation*

[5] *Kirov Military Medical Academy, Saint Petersburg, 194044, Russian Federation*

[1] ksusha.ks4300@gmail.com✉, https://orcid.org/0009-0000-7643-4209
[2] xramoval@gmail.com, https://orcid.org/0000-0003-0285-6526
[3] megalor@gmail.com, https://orcid.org/0000-0001-9770-7739
[4] daxadaeva@list.ru, https://orcid.org/0009-0002-6701-6157;
[5] 3162256@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-0925-7596
[6] lor-obchestvo@bk.ru, https://orcid.org/0000-0001-9195-128X

Abstract. Relevance. 4-6% of people have hearing problems of varying degrees, and this percentage is getting higher every year. This pathology can often negatively affect the quality of life of patients, exacerbating cognitive deficits (especially in the elderly and senile age), affect their psychoemotional status, causing and contributing

© К. О. Самсонова, Е. А. Левина, С. В. Левин, П. М. Дахадаева, Ю. К. Янов, В. В. Дворянчиков, 2025